

日本脳炎の予防接種



日本脳炎は、日本脳炎ウイルスにより発生する疾病で、蚊を介して感染します。突然の高熱、頭痛、おう吐などで発病し、意識障がいやまひなどの神経系の障がいを引き起こす病気で、後遺症を残すことや死に至ることもあるため予防が大切です。

国では、健康被害の発生により、平成17年度から21年度まで、予防接種を積極的には勧めていませんでした。その後、新ワクチンの接種ができるようになったため、年齢ごとに順次接種を案内しています。

対象年齢や接種歴を確認して、早めに予防接種を受けましょう。

●必要なもの 母子健康手帳

※接種場所や指定医療機関は市ホームページ、広報「大野城」4月1日号に折り込んだ健康パンフレットを確認するか、問い合わせてください。

※事前に予約が必要な場合があります。



健康パンフレット

日本脳炎予防接種（通常）

| | | 対象年齢 | 標準的な接種年齢 | 接種方法 |
|----|----|----------------|----------|----------------------------------|
| 1期 | 初回 | 生後6カ月以上7歳6カ月未満 | 3歳 | 6日以上の間隔をあけて（6～28日の間隔が望ましい）2回接種 |
| | 追加 | | 4歳 | 前回の後、6カ月以上の間隔をあけて（約1年後が望ましい）1回接種 |
| 2期 | | 9歳以上13歳未満 | 9歳 | 1回接種 |

特例接種

| 対象者 | 接種期間 | 今年度接種を積極的に勧める学年・年齢 | 接種方法 | | |
|-----------------------------------|-------|------------------------------|-----------|----|-------------------|
| 平成14年4月2日～平成19年4月1日生まれで、接種機会を逃した人 | 20歳未満 | 高校3年生に相当する年齢（2期が終わっていない場合のみ） | すでに接種した回数 | 0回 | 通常（上の表）の接種方法で4回接種 |
| | | | | 1回 | 6日以上の間隔をあけて3回接種 |
| | | | | 2回 | 6日以上の間隔をあけて2回接種 |
| | | | | 3回 | 6日以上の間隔をあけて1回接種 |

| 対象者 | 接種期間 | 過去の接種歴 | 接種方法 | | |
|--|-----------|------------------------------|-----------|--|-----------------|
| 平成21年4月2日～平成21年10月1日生まれで、接種機会を逃した人 ※接種時の年齢が13歳以上の場合は対象外となります。 | 9歳以上13歳未満 | 平成22年3月31日までに1回以上接種をしたことがある人 | すでに接種した回数 | 1回 | 6日以上の間隔をあけて3回接種 |
| | | | | 2回 | 6日以上の間隔をあけて2回接種 |
| | | | | 3回 | 6日以上の間隔をあけて1回接種 |
| | | すでに接種した回数 | 0回 | 通常（上記表）の接種方法で4回接種 | |
| | | | 1回 | 3回接種（3回目は2回目の接種から6カ月以上の間隔（約1年後が望ましい）をあけて接種、4回目は3回目から6日以上の間隔をあけて接種） | |
| | | | 2回 | 6日以上の間隔をあけて2回接種 | |
| | | | 3回 | 6日以上の間隔をあけて1回接種 | |

※接種の間隔については、接種医とよく相談してください。

●問い合わせ先 こども健康課母子保健担当 ☎(580)1978